


NEURALGIA DEL TRIGEMINO – UN POCO MÁS QUE DOLOR. CASO ATÍPICO

Dr. Chirolías J, Servicio de Salud Mental y Neurología, Hospital Pedro T. Orellana. Trenque Lauquen. Buenos Aires. Argentina.

Introducción

La neuralgia del trigémino es probablemente uno de los procesos neurológicos más dolorosos, debilitante de carácter electrizante suele ser unilateral, discreto predominio derecho. Solamente en un 2%-5% es bilateral, siendo entonces obligado pensar que se trate de una forma familiar o una manifestación sintomática de la esclerosis múltiple o de una conectivopatía. Incidencia entre 4-15/100.000 habitantes. Prevalencia de 0,04%. Predominio mujeres (1,7/1), especialmente si son mayores de 45 años el 90%. En el 90%-95% se afecta la tercera o especialmente la segunda rama.



Objetivos

Analizar un cuadro doloroso crónico, de causa atípica.


Métodos

CASO CLINICO: Mujer de 57 años de edad con antecedentes de N.T. padece descargas eléctricas dolorosas paroxísticas de 5 minutos de evolución, localizadas en maxilar derecho con irradiación nasogeniana que describe como insoportable. El dolor es desencadenado al comer, o rozar labio. Sin anomalías dentarias. Exploración neurológica sin hallazgos significativos. Gran refractariedad al tratamiento analgésico y antineurítico. Se destaca anomalía postural cervical asociado a consumo de masas musculares de 4 miembros, reflejos vivos, por lo cual solicitan estudios.

Resultados

Se practicó RNM ENCEFALO Y CERVICAL en la cual se observa alteración de la alineación craneocervical, con subluxación superior de la apófisis odontoides que se proyecta por encima del clivus, que genera severa deformidad de la unión bulbo-protuberancial y del cordón medular superior, con severo conflicto espacial.

Así mismo se observa desalineación C5-C6 con pseudoprotusión discal posterior y bilateral que genera importante compromiso neuroforaminal bilateral.



Conclusiones

Tener en cuenta el origen multicausal de daño sobre el N.T. siendo los más habituales las de causa desconocida, entre las conocidas la Esclerosis múltiple por daño de la mielina que envuelve al nervio, también tumores o vasos sanguíneos, el trauma facial o cirugía oral y senos paranasales. Observamos en este caso una lesión articular craneocervical con comportamiento tumoral extracerebral-intra-extracraneal invasivo.

Bibliografía: 1 <https://www.enfermedadesgraves.com/blog/neuralgia->

2 <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases/trigeminal-neuralgia-20353344>

3 <https://medlineplus.gov/spanish/trigeminalneuralgia.html>

4 Clínica de Navarra <http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/neuralgia-trigeminio>