

ESTRATEGIAS PARA EL ABORDAJE NEUROPSIQUIÁTRICO EN LA DEMENCIA REONTOTEMPORAL.

Autores: Bravo J. Carbonetti F. Díaz G. Maidana B. Mortoro A. Pagliarulo A. Rojo M. Romano M. Suarez M. vasquez M

Filiación:

Introducción

La demencia frontotemporal (DFT) es una afectación de la región frontal y temporal de los lóbulos correspondientes, caracterizada por cambios en la personalidad y la conducta. Para el mismo se requiere de la aplicación de adecuadas herramientas de evaluación neuropsicológicas, las cuáles deben ser breves, fáciles de aplicar, sensibles, específicas y con un valor predictivo apropiado. Los aspectos a evaluar son: memoria, funcionamiento ejecutivo, atención, desempeño visuoespacial, evaluación cognitiva, afectiva, social y la teoría de la mente.

Objetivos

Evaluar las pruebas más utilizadas para detectar los cambios en el funcionamiento cognitivo y la afectación del lenguaje (Afasia Progresiva no fluente, Afasia Progresiva Semántica o Demencia Semántica Y Afasia Logopénica) incluídos bajo la denominación de Afasia Progresiva Primaria (APP)

Métodos

Estudios Observacionales

Resultados

MMSE: Permite valorar deterioro cognitivo, su gravedad y variación en el tiempo.

ACE: con sus dos variantes ACE- R y ACE- III, siendo esta última útil para diferenciar Enfermedad por Alzheimer de DFT.

Digits Span Forward, Stroop Color and Word Test, Trail Making Test y Conners Continuous Performance Test: La mayoría de los apientes presentan déficit de atención, el cuál influye sobre las pruebas de evaluación cognitivas.

AVTL, FCSRT Pruebas de evaluación autobiográfica y el Cambridge Prospective Memory Test: en la DFT existe preservación relativa de la memoria episódica y de la semántica (A diferencia de la Enfermedad de Alzheimer y Demencia Semántica)

Rey Osterrieth, VOSP, GFT, Face- Place Test: Los pacientes con DFT obtienen resultados insatisfactorios cuando se aplican estas pruebas, lo cuál podría vincularse al déficit ejecutivo.

FAB, IFS: La afectación temprana de la corteza frontal genera disfunción ejecutiva, afectando; Planificación, juicio, razonamiento, control inhibitorio, resolución de problemas y memoria de trabajo.

Pruebas incluídas en la PALPA: Para evaluar la afectación del lenguaje, se requieren pruebas de comprensión, producción del discurso, lectura y escritura. Permite diferenciar el déficit observado en la Demencia Semántica del de la Afasia Progresiva Logopénica.

Faux Pas Test, Mind in the Eyed, Mind in the Voice, Face Task y las pruebas de las falsas creencias: existe un déficit relacionado con la Teoría de la mente, el cuál es característico y superior al hallado en la Enfermedad de Alzheimer. Importante a la hora del diagnóstico temprano de la DFT.

TASIT- R, IRI: Permite evaluar el reconocimiento de las emociones.

Hotel Task e Iowa Gambling Task: permiten evaluar el funcionamiento ejecutivo.

Conclusiones

Existen diferentes pruebas para evaluar el déficit neuropsicológico en la DFT, si bien los resultados obtenidos en dichas pruebas no permiten diferenciar la DFT de otros tipos de demencia, resultan de gran utilidad en la evaluación clínica y neuropsicológica. Aunque la mayoría de las pruebas se encuentran en etapa de investigación, se espera su aplicación de rutina en la práctica clínica.